

## 乳癌(BC)

レジメン名	使用抗癌剤	用量	用法	投与日	1コースの期間	備考
AC	アドリアシン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	3週間	
	エンドキサン	600mg/m <sup>2</sup>				
Amab/wnabPTX	テセントリク	840mg	点滴静注	d1,15	4週間	
	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>		d1,8,15		
DOC/CPA	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	3週間	
	エンドキサン	600mg/m <sup>2</sup>				
FEC	ファルモルビシン	60~100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	3週間	
	エンドキサン	500mg/m <sup>2</sup>				
	フルオロウラシル	500mg/m <sup>2</sup>				
EC	エピルビシン	90mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	3週間	
	エンドキサン	600mg/m <sup>2</sup>				
HAL	ハラヴェン	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1,8	3週間	
KEY	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	d1	3週間	
LDnabPTX	アブラキサン	175mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	3週間	
nabPTX	アブラキサン	260mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	3週間	
PER/HER/DOC	パージェタ	初回840mg・2回目以降420mg	点滴静注	d1	3週間	
	トラスツズマブ	初回8mg/kg・2回目以降6mg/kg				
	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>				
T-DM1	カドサイラ	3.6mg/kg	点滴静注	d1	3週間	
wHER	トラスツズマブ	初回4mg/kg・2回目以降2mg/kg	点滴静注	d1	1週間	
wnabPTX/Beva	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1,8,15	4週間	
	ベバシズマブ	10mg/kg		d1,15		
wPTX	タキソール	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1,8,15	4週間	
wPTX/Beva	タキソール	90mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1,8,15	4週間	
	ベバシズマブ	10mg/kg		d1,15		
wPTX/wHER	タキソール	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1,8,15	4週間	
	トラスツズマブ	初回4mg/kg・2回目以降2mg/kg		d1,8,15,22		
3wDOC	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	3週間	
3wHER	トラスツズマブ	初回8mg/kg・2回目以降6mg/kg	点滴静注	d1	3週間	

3wHER/wPTX	タキソール	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1,8,15	4週間	
	トラスツズマブ	初回8mg/kg・2回目以降6mg/kg		d1		
3wHER/nabPTX	アブラキサン	260mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	3週間	
	トラスツズマブ	初回8mg/kg・2回目以降6mg/kg				
3wPTX	タキソール	175mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	3週間	
Cape/PTX	カペシタビン	添付文書A法	内服	d1~14	3週間	
	タキソール	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1,8		