

大腸癌(CRC)

レジメン名	使用抗癌剤	用量	用法	投与日	1コースの期間	備考		
Afl β /FOLFIRI	ザルトラップ [®]	4mg/kg	点滴静注	d1	2週間			
	イリノテカン	150mg/m ²						
	レボホリナート	200mg/m ²						
	フルオロウラシル 急速	400mg/m ²						
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²						
Beva/CAPIRI	カペシタビン	1000mg/m ²	内服	d1~14	3週間			
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	d1				
	イリノテカン	150mg/m ²		d1				
Beva/FTD/TPI	ロンサーフ	70mg/m ²	内服	d1~5,d8~12	4週間			
	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	d1,15				
Beva/FTD/TPI②	ロンサーフ	70mg/m ²	内服	d1~5	2週間			
	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	d1				
Beva/FOLFIRI	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	d1	2週間			
	イリノテカン	150mg/m ²						
	レボホリナート	200mg/m ²						
	フルオロウラシル 急速	400mg/m ²						
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²						
Beva/FOLFOXIRI	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	d1	2週間			
	イリノテカン	150mg/m ²						
	レボホリナート	200mg/m ²						
	オキサリプラチニ	85mg/m ²						
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²						
Beva/IRIS	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~14	4週間			
	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	d1,15				
	イリノテカン	125mg/m ²						
Beva/mFOLFOX6	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	d1	2週間			
	オキサリプラチニ	85mg/m ²						
	レボホリナート	200mg/m ²						
	フルオロウラシル 急速	400mg/m ²						
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²						

Beva/sLV5FU2	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	d1	2週間			
	レボホリナート	200mg/m ²						
	フルオロウラシル 急速	400mg/m ²						
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²		d1~3				
Beva/SIR	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~14	3週間			
	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	d1				
	イリノテカン	150mg/m ²						
Beva/SOX	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~14	3週間			
	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	d1				
	オキサリプラチニ	130mg/m ²						
Beva/XELOX	カペシタビン	1000mg/m ²	内服	d1~14	3週間			
	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	d1				
	オキサリプラチニ	130mg/m ²		d1				
Cmab/FOLFIRI	アービタックス	初回400mg/m ² ・2回目以降250mg/m ²	点滴静注	d1,8	2週間			
	イリノテカン	150mg/m ²		d1				
	レボホリナート	200mg/m ²						
	フルオロウラシル 急速	400mg/m ²						
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²						
Cmab/mFOLFOX6	アービタックス	初回400mg/m ² ・2回目以降250mg/m ²	点滴静注	d1,8	2週間			
	オキサリプラチニ	85mg/m ²		d1				
	レボホリナート	200mg/m ²						
	フルオロウラシル 急速	400mg/m ²						
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²						
CPT-11①	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	d1	2週間			
FOLFIRI	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	d1	2週間			
	レボホリナート	200mg/m ²						
	フルオロウラシル 急速	400mg/m ²						
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²						
mFOLFOX6	オキサリプラチニ	85mg/m ²	点滴静注	d1	2週間			
	レボホリナート	200mg/m ²						
	フルオロウラシル 急速	400mg/m ²						
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²						
P-mab	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注	d1	2週間			

Pmab/FOLFIRI	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注	d1	2週間	
	イリノテカン	150mg/m ²				
	レボホリナート	200mg/m ²				
	フルオロウラシル 急速	400mg/m ²				
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²				
Pmab/mFOLFOX6	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注	d1	2週間	
	オキサリプラチニ	85mg/m ²				
	レボホリナート	200mg/m ²				
	フルオロウラシル 急速	400mg/m ²				
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²				
RPMI	レボホリナート	250mg/m ²	点滴静注	d1,8,15,22,29,36	8週間	
	フルオロウラシル	500mg/m ²				
SIR	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~14	3週間	
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	d1		
sLV5FU2	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	d1	2週間	
	フルオロウラシル 急速	400mg/m ²				
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²				
SOX	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~14	3週間	
	オキサリプラチニ	130mg/m ²	点滴静注	d1		
wCPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注	d1,8,15	5週間	
XELOX	カペシタビン	1000mg/m ²	内服	d1~14	3週間	
	オキサリプラチニ	130mg/m ²	点滴静注	d1		