

食道癌(EC)

| レジメン名 | 使用抗癌剤 | 用量 | 用法 | 投与日 | 1コースの期間 | 備考 |
|-------------|------------------|----------------------|------|---------|---------|-----------------------------|
| FP | ランダ | 80mg/m ² | 点滴静注 | d1 | 4週間 | |
| | フルオロウラシル持続(24hr) | 800mg/m ² | | d1~5 | | |
| LD5-FU/CDDP | ランダ | 10mg | 点滴静注 | ※ | 4週間 | ※d1~5,d8~12,d15~19,d22~26投与 |
| | フルオロウラシル持続(24hr) | 500mg | | | | |
| 4wNIV | オプジーボ | 480mg/body | 点滴静注 | d1 | 4週間 | |
| 2wNIV | オプジーボ | 240mg/body | 点滴静注 | d1 | 2週間 | |
| NIV/IPI | オプジーボ | 360mg/body | 点滴静注 | d1,21 | 6週間 | |
| | ヤーボイ | 1mg/kg | | d1 | | |
| S1/CDDP① | エスワンタイホウ | 80mg/m ² | 内服 | d1~21 | 5週間 | |
| | ランダ | 60mg/m ² | | d8 | | |
| wPTX | タキソール | 100mg/m ² | 点滴静注 | d1,8,15 | 4週間 | |
| 3wDOC | ドセタキセル | 70mg/m ² | 点滴静注 | d1 | 3週間 | |