

胃癌(MK)

レジメン名	使用抗癌剤	用量	用法	投与日	1コースの期間	備考
CPT-11①	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	d1	2週間	
CPT-11②	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	d1,15	5週間	
KEY	キイトルーダ	200mg	点滴静注	d1	3週間	
mFOLFOX6	オキサリプラチニン	85mg/m ²	点滴静注	d1	2週間	内服困難な場合に限る
	レボホリナート	200mg/m ²		d1		
	フルオロウラシル 急速	400mg/m ²		d1		
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²		d1~3		
nabPTX	アブラキサン	260mg/m ²	点滴静注	d1	3週間	
NIV	オプジー [®]	240mg	点滴静注	d1	2週間	
NIV/mFOLFOX6	オプジー [®]	240mg	点滴静注	d1	2週間	
	オキサリプラチニン	85mg/m ²		d1		
	レボホリナート	200mg/m ²		d1		
	フルオロウラシル 急速	400mg/m ²		d1		
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²		d1~3		
NIV/SOX	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~14	3週間	
	オプジー [®]	360mg	点滴静注	d1		
	オキサリプラチニン	130mg/m ²		d1		
NIV/XELOX	カペシタビン	1000mg/m ²	内服	d1~14	3週間	
	オプジー [®]	360mg	点滴静注	d1		
	オキサリプラチニン	130mg/m ²		d1		
RAM	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注	d1	2週間	
RAM/wPTX	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注	d1,15	4週間	
	タキソール	80mg/m ²		d1,8,15		
RAM/nabPTX	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注	d1	2週間	1コースの期間が違うためd1が同日とならないことがある。
	アブラキサン	180mg/m ²		d1	3週間	
RAM/w-nabPTX	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注	d1,15	4週間	
	アブラキサン	100mg/m ²		d1,8,15		
S1/CDDP①	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~21	5週間	
	ランダ	60mg/m ²	点滴静注	d8		

S1/DOC①	エスワンタイホウ ドセタキセル	80mg/m ² 40mg/m ²	内服 点滴静注	d1~14 d1	3週間	
S1/DOC・S1	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~14	3週間	1コース目に実施
	ドセタキセル	40mg/m ²	点滴静注	d1	3週間	
	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~14	3週間	2~7コース目に実施
	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~28	6週間	8コース目以降 術後1年後まで
SOX	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~14	3週間	
	オキサリプラチニン	130mg/m ²	点滴静注	d1		
S1/PTX①	エスワンタイホウ	80mg/m ²	内服	d1~14	3週間	
	タキソール	50mg/m ²	点滴静注	d1,8,15		
wPTX	タキソール	80mg/m ²	点滴静注	d1,8,15	4週間	
XELOX	カペシタビン	1000mg/m ²	内服	d1~14	3週間	
	オキサリプラチニン	130mg/m ²	点滴静注	d1		
3wDOC②	タキソテール	60mg/m ²	点滴静注	d1	3週間	
3wHER/wPTX	トラスツズマブ	初回8mg/kg・2回目以降6mg/kg	点滴静注	d1	3週間	1コースの期間が違うためd1が同日とならないことがある。
	タキソール	80mg/m ²		d1,8,15	4週間	
3wHER/XELOX	トラスツズマブ	初回8mg/kg・2回目以降6mg/kg	点滴静注	d1	3週間	
	オキサリプラチニン	130mg/m ²		d1		
	カペシタビン	1000mg/m ²		d1~14		
3wHER/XP	トラスツズマブ	初回8mg/kg・2回目以降6mg/kg	点滴静注	d1	3週間	
	ランダ	80mg/m ²		d1		
	カペシタビン	1000mg/m ²		d1~14		
6wKEY	キイトルーダ	400mg	点滴静注	d1	6週間	