

## 膵臓癌(PK)

レジメン名	使用抗癌剤	用量	用法	投与日	1コースの期間	備考
CDDP/GEM	ランダ	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1,8	3週間	
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>				
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1,8,15	4週間	
mFOLFIRINOX	エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	2週間	
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>				
	トポテシン	150mg/m <sup>2</sup>		d1		
	5-FU 持続(46hr)	2400mg/m <sup>2</sup>				
nabPTX/GEM	アブラキサン	125mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1,8,15	4週間	
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>				
nalIRI/FL	オニバイド	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	2週間	
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>		d1		
	5-FU持続(46hr)	2400mg/m <sup>2</sup>				
S1/GEM①	エスワнтаイホウ	60mg/m <sup>2</sup>	内服	d1~14	4週間	
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1,15		
S1/GEM②	エスワнтаイホウ	60-80mg/m <sup>2</sup>	内服	d1~14	4週間	
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d8,15		
S1/GEM③	エスワнтаイホウ	60-80mg/m <sup>2</sup>	内服	d1~14	4週間	
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1,8		