

膵臓癌(PK)

レジメン名	使用抗癌剤	用量	用法	投与日	1コースの期間	備考		
CDDP/GEM	ランダ	25mg/m ²	点滴静注	d1,8	3週間			
	ゲムシタビン	1000mg/m ²						
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	d1,8,15	4週間			
mFOLFIRINOX	オキサリプラチニン	85mg/m ²	点滴静注	d1	2週間			
	レボホリナート	200mg/m ²						
	イリノテカン	150mg/m ²		d1				
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²						
nabPTX/GEM	アブラキサン	125mg/m ²	点滴静注	d1,8,15	4週間			
	ゲムシタビン	1000mg/m ²						
nallRI/FL	オニバイド	70mg/m ²	点滴静注	d1	2週間			
	レボホリナート	200mg/m ²						
	フルオロウラシル 持続(46hr)	2400mg/m ²		d1				
S1/GEM①	エスワンタイホウ	60mg/m ²	内服	d1~14	4週間			
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	d1,15				
S1/GEM②	エスワンタイホウ	60-80mg/m ²	内服	d1~14	4週間			
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	d8,15				
S1/GEM③	エスワンタイホウ	60-80mg/m ²	内服	d1~14	4週間			
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	d1,8				